



M DESIGN STUDIO PLZEŇ, s.r.o.  
chirurgické oddělení  
www.chirurgie.iplace.cz  
vedoucí lékař: MUDr. Vlastimil Říha  
Tachovská 80  
323 00 Plzeň

## **Informovaný souhlas pacienta s operačním výkonem**

Pacient (příjmení, jméno, titul):

Datum narození

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče!  
Naším pracovištěm Vám bylo navrženo operační řešení:

Před tímto výkonem jste byl(a) informován(a) o okolnostech, které vedly k navržení výše jmenovaného zákroku., o povaze a způsobu provedení, možných komplikacích a dalším vývoji onemocnění.

**Prosím, ptejte se na vše, co se Vám zdá důležité !!!**

### **Příprava k výkonu:**

Každé operaci předchází klinické vyšetření a je-li to nutné, doplněné o potřebná vyšetření (RTG, EMG, případně další dle doporučení lékaře).

Před operací není potřeba žádné speciální přípravy pacienta. Operační pole musí být čisté a zbaveno ochlupení v nejnnutnějším rozsahu. Vzhledem k tomu, že výkon je prováděn v místním umrtvení, nepřicházejte lační, je možné se najíst lehkého jídla a buďte dostatečně zavodněni. Všechny své léky, které pravidelně užíváte, si berte tak, jak máte předepsáno. V den výkonu nekonzumujte žádné alkoholické nápoje!

Lékaři nahlaste všechna chronická onemocnění (zvláště onemocnění cukrovkou) a všechny alergie!

### **Operační zákrok:**

Operační výkon je prováděn na operačním sále. Proto počítejte s tím, že si na předsálí budete odkládat do spodního prádla, ve kterém teprve odejdete na sál.

Výkon je prováděn v lokální anestezii (místním umrtvení), při její aplikaci budete upozorněni na bodnutí a aplikaci anestetika, které je provázeno mírnou bolestí event. pálením.

V průběhu vlastního výkonu nesmíte cítit bolest, pokud ji začnete vnímat, ihned upozorněte operujícího lékaře. Téměř vždy je možné zvýšit dávku anestetika tak, aby výkon nebyl nijak bolestivý. Účinek anestetika přetrvává ještě asi 4 až 8 hodin od operace, tedy v době, kdy vlastní rána již přestává bolet a proto je pooperační průběh z hlediska bolesti velmi snesitelný. Je možné užít běžná analgetika. Pokud lékař předpokládá bolestivější pooperační průběh, vždy Vás na tuto skutečnost upozorní a vybaví Vás příslušnými léky proti bolesti, nebo Vám vhodná analgetika doporučí.

Po operaci ihned odcházíte domů, doprovod je tedy vhodný.

### **Vyšetření operované tkáně:**

Pokud to charakter zákroku vyžaduje nebo v průběhu výkonu má operátor diagnostické rozpaky, je vždy vzorek tkáně odeslán na histologické vyšetření. O výsledku bude pacient informován ihned po jeho doručení (většinou 10 dnů) a bude vytištěn i na lékařské zprávě, kterou operovaný pacient nosí na kontroly s sebou.

### **Chování po operaci:**

Po zákroku absolvujete několik převazů, první je 1.-3. den od výkonu. Stehy se odstraňují podle charakteru zákroku 7.-14. den od operace (někdy dříve, dle charakteru onemocnění). Vzhledem k tomu, že se na sešití operační rány používají nejmodernější materiály, není termín odstranění stehů rozhodující. Šicí materiál je nesmáčenlivý a v ránu nijak nedráždí.

Po zákroku nedoporučujeme zvýšenou fyzickou zátěž, aby rána nebyla namáhána, nedocházelo k nadměrnému pocení a nenarušovalo se tak hojení. Jizvu není vhodné 3 – 6 měsíců vystavovat účinku slunečního záření.

### **Rizika, možné komplikace:**

Nežádoucí celková reakce na znecitlivující látku je vzácná (pokles krevního tlaku, dechové obtíže, pocit na zvracení, nevolnost, svědění, vyrážka) a u moderních lokálních anestetik se téměř nevyskytuje. **Pokud se v průběhu operace necítíte dobře, ihned obtíže hlase!!**

Reakce na dezinfekční látku může vzniknout i po několika hodinách (svědění a pálení kůže, vyrážka). V současné době používané prostředky jsou velmi šetrné ke kůži.

Krvácení z rány se může projevit při poruchách srážlivosti, neléčeném vysokém krevním tlaku nebo při užívání léků s protisrážlivým účinkem.

Infekce v ráně se objeví za situace, kdy byl v operované afekci přítomen zánět (např. infikovaný atherom), může se do rány dostat při operaci (tomu bráníme prováděním zákroku na operačním sále za dodržení všech pravidel pro práci ve sterilním prostředí), může se do rány dostat krevní nebo mízní cestou z jiné části organismu, kde je infekce přítomna (např. hnisavý váček zubu).

Rozestup rány může vzniknout po druhotné infekci rány, krvácení do rány nebo po nadměrném fyzickém namáhání místa operace.

Zvýšená pigmentace (tmavší zabarvení) okolí jizvy může vzniknout po oslunění čerstvé jizvy, většinou je přechodná a v průběhu měsíců vymizí.

### **Prohlášení:**

Byl(a) jsem podrobně seznámen(a) u plánovaného zdravotního výkonu se všemi alternativami léčby a jejich výhodami a riziky a měl(a) jsem možnost si jednu z alternativ zvolit.

Byl(a) jsem seznámen(a) s možným omezením v obvyklém způsobu života, s možnými očekávanými změnami zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti.

Byl(a) jsem seznámen(a) s léčebným režimem, vhodnými preventivními opatřeními a s možnými kontrolními zdravotními výkony.

**Prohlašuji, že jsem mohl(a) klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno a že jsem informacím a poučení plně porozuměl(a) a souhlasím s navrhovaným postupem.**

V případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví, souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony.

V Plzni dne

podpis